

殺虫剤

第 3233 号

ディプレックス® 乳剤

種類名：DEP乳剤

特長
●食毒・接触毒・ガス毒の諸作用で広範囲の害虫に優れた防除効果を示します。
●種々の作物に登録があります。

【有効成分】 DEP (PRTR法第1種-167号) 50.0%
(新番号第1種-225号) 50.0%

【性状】 赤色可乳化油状液体 【毒性】 劇物 【危険物】 1石-I

【有効年限・包装】 3年・500mL×20

ディプレックス® はユービーエルの登録商標です。

適用害虫・使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DEP
稲	ニカメイチュウ第1世代	700倍	3~4L /10a	収穫14日前まで	4回以内	空中散布	4回以内
	ニカメイチュウ第2世代	500倍					
	サンカメイチュウ第3世代	2000倍					
	フタオビコヤガ	1000倍					
	イネツトムシ	500倍~1000倍					
	イネドロオウムシ	700倍~1000倍					
ウツカ類、アワヨトウ	800倍~1000倍						
みかん	コアオハケムグリ、カメムシ類	800倍	3L/10a	収穫30日前まで	5回以内	散布	5回以内
りんご	ハマキムシ類	1000倍~1200倍	3L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	マイマイガ	1000倍					
かき	カメムシ類、イラガ類	1000倍	3L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
なし	ハマキムシ類	500倍~1000倍	3L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
ぶどう	コガネムシ類成虫	1000倍	3L/10a	収穫60日前まで	4回以内	散布	4回以内
キウイフルーツ	カメムシ類、コガネムシ類	500倍	3L/10a	裂果前	5回以内	散布	5回以内
くり	モモノゴマダラノメイガ	800倍~1000倍	3L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
まろん	ウリハムシ成虫	800倍~1000倍	3L/10a	収穫7日前まで	6回以内	散布	6回以内
まくわうり	アブラムシ類	500倍~1000倍	3L/10a	移植活着後(仮植床)	1m ² 当たり2L苗床灌注	散布	3回以内
いちご	アブラムシ類	500倍~1000倍	3L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
	イチゴメセンチュウ	500倍					
	テントウムシダマシ類	1000倍					
なす	ヨトウムシ、アブラムシ類	800倍~1000倍	3L/10a	収穫前日まで	6回以内	散布	6回以内
きゅうり	ヨトウムシ成虫	800倍~1000倍	3L/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内
	アブラムシ類	500倍~1000倍					
	コナガ、ヨトウムシ	500倍~1000倍					
だいこん	アオムシ	800倍~1000倍	3L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	1回
	キスジノミハムシ成虫	800倍~1000倍					
	ハイマダラノメイガ	500倍~1000倍					
かぶ	コナガ、ヨトウムシ	1000倍	3L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	アオムシ	800倍~1000倍					
	キスジノミハムシ成虫	500倍~1000倍					
カリフラワー	アオムシ	1000倍	3L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
	キスジノミハムシ成虫	800倍~1000倍					
	ハイマダラノメイガ	500倍~1000倍					
はくさい	アオムシ	1000倍	3L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	キスジノミハムシ成虫	800倍~1000倍					
	ハイマダラノメイガ	500倍~1000倍					
キャベツ	アオムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	キスジノミハムシ成虫	800倍~1000倍					
	ハイマダラノメイガ	500倍~1000倍					
畑わさび	カブラハバチ、アオムシ	1000倍	3L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
わさび	コナガ、ヨトウムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
にんじん	キアゲハ幼虫	800倍~1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
ばれいしょ	テントウムシダマシ類	1000倍	3L/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内
	ヨトウムシ	500倍~1000倍					
かんしょ	ナカジロシタバ	700倍~1000倍	3L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
	ハスモンヨトウ	500倍					
	イモコガ	1000倍					
てんさい	アカビロウドコガネ成虫	1000倍	3L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ	500倍~700倍					
茶	コカクモンハマキ	1000倍	3L/10a	摘採14日前まで	2回以内	散布	2回以内
チャドクガ、チャノホソガ	1000倍	3L/10a	摘採14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
たばこ	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
タバコアオムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
芝	スジキリヨトウ	800倍~1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
いね科牧草	アワヨトウ	800倍~1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
まめ科牧草	ハスモンヨトウ、ゾウムシ類	500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
桑	クワノメイガ	1000倍	3L/10a	摘採14日前まで	-	散布	-
	アメリカシロヒトリ	1500倍					
	ヒシモンヨコバイ	1500倍					
ハゴロモ類	1500倍	3L/10a	摘採14日前まで	-	散布	-	
花き類・観葉植物(カーネーション宿根かすみそうほおすきを除く)	ヨトウムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
カーネーション	アオムシ、コナガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
ハモグリバエ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ヨトウムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
宿根かすみそう	ハモグリバエ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
ヨトウムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ほおすき	テントウムシダマシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
カメムシ類、ヨトウムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
樹木類(さんごじゅを除く)	マツケムシ、ウメケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
マイマイガ、モンクロシャチホコ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ミノガ類、クスサン	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
クスサン、ミノウスバ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
チャドクガ、キオビエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
コウマダラエダシヤク	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アメリカシロヒトリ	1500倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
アブラムシ類	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ワタノメイガ、マツケムシ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
ウメケムシ、マイマイガ	1000倍	3L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内	
モンクロシャチホコ、ミノガ類	1000倍						