

ダイアジノンが、  
さらに使いやすくなりました!

殺虫剤

# ショットガン®

ダイアジノンEW\*



ショットガンは、有効成分を水に乳化分散した EW製剤です。これにより、ダイアジノンの効果に加え、様々な特長が生まれました。

\*Emulsion, Oil in Water

®は日本化薬(株)の登録商標です。

特長

## ◆水ベースの製剤のため、多くの利点が生まれました。

- 臭気がきわめて少なく、使いやすい製剤です。
- 希釈が容易になりました。
- “消防法上の危険物”ではないため、保管が容易です。


## ◆有効成分のダイアジノンが、すぐれた殺虫効果を発揮します。

## ■適用害虫および使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	本剤およびダイアジノンを含む農薬の総使用回数
ねぎ わけぎ あさつき たまねぎ	ネギアザミウマ	1000倍	200ℓ/10a	収穫21日前まで	散布	2回以内
				収穫30日前まで		
	200~300ℓ/10a		収穫21日前まで			
茶	クワシロカイガラムシ		1000ℓ/10a	最終摘採後 ~12月まで		1回
芝	シバットガ スジキリトウ シバオサゾウムシ成虫	0.3ℓ/m <sup>2</sup>	発生初期	4回以内		
	コガネムシ類幼虫	3ℓ/m <sup>2</sup>				
	さくら	アメリカシロヒトリ			—	
つつじ類	ツツジグンバイ	0.15~0.3ℓ/m <sup>2</sup>		2回以内		

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 貯蔵中に分離することがあるので、使用直前に容器をよく振って使用してください。
- 本剤の散布薬液は、希釈調製後できるだけ速やかに使用してください。
- コガネムシ類幼虫防除には散布液が土壌中に十分しみこむように散布し、シバットガ、スジキリトウ、シバオサゾウムシの防除には芝表面、地際にまきむらのないように散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - ②養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。

 ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

## ⚠ 安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱には十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤およびPAM製剤があります。

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。



- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣等を着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。



- 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。



- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

- 水産動植物(甲殻類、ドジョウ、ボラ)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起こすので、養殖池等周辺での使用は避けてください。

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

## ⚠ 貯蔵上の注意

- 直射日光を避け、食品と区別し、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。盗難、紛失の際は、警察に届け出てください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。

この印刷物は、平成25年12月現在の登録内容に準拠して作成しました。