

# 殺菌剤

農薬登録番号：第 22170 号  
肥料登録番号：生第 88820 号

# サンブレイク<sup>®</sup> 液剤

農薬種類名：ヒドロキシイソキサゾール複合肥料  
肥料の種類：液状複合肥料

## 特長

- 芝の赤焼病に有効です。
- 吸収性の高い亜りん酸、水溶性加里を配合した肥料入り農薬です。
- 根の生育も促進します。

【有効成分】 ヒドロキシイソキサゾールカリウム塩 …………… 22.84%  
(ヒドロキシイソキサゾール …………… 16.5%)

【肥料成分】 水溶性りん酸 …………… 18.0%  
水溶性加里 …………… 20.0%

【性状】 黄赤色澄明水溶性液体 【毒性】 普通物<sup>\*</sup> 【危険物】 一

【有効年限・包装】 5年・500mL×20

(正味重量700g×20)

<sup>\*</sup>普通物：「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

サンブレイクは三井化学アグロ(株)の登録商標です。

## 適用病害虫・使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ヒドロキシイソキサゾール
西洋芝 (ベントグラス)	赤焼病 ビシウム病	250~500倍	0.5L/m <sup>2</sup>	発病初期	4回以内	散布	6回以内
	根の生育促進			生育期 (6月~8月)	3回		

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

## 使用上の注意

- (1)使用前によく振ってから使用すること。
- (2)使用量が多すぎたり濃度が高すぎた時、場合によっては初期生育が一時制御されることがあるので、濃度や使用量を誤らないように注意すること。
- (3)根の生育促進に使用する場合は生育期(6月~8月)に1ヶ月間隔で3回散布すること。
- (4)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- (1)有毒ガスが発生するので、石灰硫黄合剤との混合は絶対にしないこと。
- (2)本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。使用後は洗眼すること。
- (3)かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意すること。
- (4)公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

## 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

## 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用法ではその該当がない。

## 貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、食品と区別し、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。