

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソキサチオン
だいこん はつかだいこん	タネバエ ネキリムシ類	6kg/10a (6g/m ²)	は種時	1回	土壌表面散布 土壌混和处理	1回
はくさい キャベツ						
ねぎ				2回以内		4回以内 (は種時は1回以内、 植付時は1回以内、 植付後は2回以内)
わけぎ あさつき レタス 非結球レタス トマト ミニトマト なす	ネキリムシ類		は種時又は 植付時			
きゅうり		4～6kg/10a (4～6g/m ²)		1回	播溝土壌混和	1回
ほうれんそう	タネバエ				土壌表面散布 土壌混和处理	
なばな類 (オータムポエム を除く)	ヨトウムシ類	6kg/10a (6g/m ²)	は種時	1回	土壌表面散布	1回
オータムポエム	ネキリムシ類		定植時		土壌表面散布	
だいず	タネバエ	4～6kg/10a (4～6g/m ²)	は種時	2回以内	作条施用 土壌混和	2回以内
	ネキリムシ類		は種時又は 定植時			
			4kg/10a (4g/m ²)		は種時～ 本葉2葉期	
えだまめ	タネバエ ネキリムシ類	4～6kg/10a (4～6g/m ²)	は種時	1回	作条施用 土壌混和	5回以内 (粉剤及び粉粒剤の は種時の処理は 合計1回以内、 粉剤及び粉粒剤の 定植時は 合計1回以内、 粉剤の 土壌表面散布は 1回以内、 粒剤の 土壌表面株元処理は 2回以内)
			定植時			
		ネキリムシ類	4kg/10a (4g/m ²)		は種時～ 本葉2葉期	
豆類 (種実、ただし、 だいずを除く)	タネバエ ネキリムシ類	4～6kg/10a (4～6g/m ²)	は種時	1回	作条施用 土壌混和	1回
さやえんどう	コガネムシ類幼虫	9kg/10a(9g/m ²)				
さやいんげん	タネバエ	6kg/10a(6g/m ²)				
実えんどう	コガネムシ類幼虫	9kg/10a (9g/m ²)			植付時	
いちご(仮植床)						
うど	センノカミキリ	6kg/10a (6g/m ²)	成虫飛来 初期～盛期	5回以内	散布	5回以内
ほうきぎ			定植時	1回	株元散布	1回
たばこ	ネキリムシ類	6～9kg/10a (6～9g/m ²)	植付前		土壌表面散布 土壌混和处理	2回以内

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。