

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソキサチオン	
みかん	ゴマダラカミキリ成虫	1500倍	200 ~ 700L /10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内	
	カイガラムシ類 ミカンハモグリガ コカクモンハマキ クワゴマダラヒトリ若齢幼虫 ミカンサビダニ	1000~1500倍						
	コナカイガラムシ類 ミノガ類 ケシキスイ類	1000倍						
	カネタタキ	5000倍						
とうもろこし(子実)	アワノメイガ	1000倍	100 ~ 300L /10a	収穫21日前まで	2回以内	1回以内		
キャベツ	アオムシ コナガ	1500~2000倍						
いちご(仮植床)	コガネムシ類幼虫	1000~1500倍	3L/m ²	植付後	1回	灌注	1回	
たまねぎ	タマネギバエ	500~1000倍	育苗箱(約30×60×2.5cm、使用土壌約2L)1箱当り500mL	定植前		土壌灌注		
さとうきび	アオドウガネ幼虫 ハリガネムシ類	1000倍	1.8L/m ²	夏季生育期まで	3回以内	12時間 種苗浸漬	5回以内 (種苗浸漬は1回以内、 植付時の土壌混和は1回以内、 植付後は3回以内)	
	ハリガネムシ類		—	植付前				
茶	コカクモンハマキ チャノホソガ ヨモギエダシャク チャノホコリダニ	1500倍	200 ~ 400L /10a	摘採21日前まで	1回	散布	1回	
	クワシロカイガラムシ		1000L/10a					
花き類・観葉植物(きく、ガーベラ、シクラメン及びアジアントムを除く)	オンシツコナジラミ若齢幼虫	1000倍	100 ~ 300L /10a	—	4回以内		4回以内	
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソキサチオン	
きく ガーベラ	マメハモグリバエ オンシツコナジラミ若齢幼虫	1000倍	100 ~ 300L /10a	—	4回以内	散布	4回以内	
樹木類(まさき、もっこく、すぎを除く)	カイガラムシ類 ケムシ類		200 ~ 700L /10a		6回以内		6回以内	6回以内
まさき	カイガラムシ類 ケムシ類 ユウマダラエダシャク							
もっこく	カイガラムシ類 ケムシ類 モッコクハマキ							
すぎ	カイガラムシ類 ケムシ類							
たばこ	ジャガイモガ	1000倍	100 ~ 180L /10a	—	2回以内		2回以内	
	タバコガ ヤサイゾウムシ	1000~1500倍						
	ヨトウムシ	1500~2000倍						
芝	チガヤシロオカイガラムシ	1000倍	0.5L/m ²	発生初期	6回以内		6回以内	
	スジキリヨトウ		0.5 ~ 2L/m ²					
	シバツトガ シバオサゾウムシ ケラ コガネムシ類 タマナヤガ幼虫		1 ~ 2L/m ²					

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。