

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメクテン			
りんご	—	ハダニ類 キンモンホソガ リンゴサビダニ ユキヤナギアブラムシ	1000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	1回	散布	1回			
もも ネクタリン 小粒核果類 いちじく		ハダニ類 モモサビダニ			収穫7日前 まで						
なし		ハダニ類	1000～ 1500倍		収穫前日 まで	2回以内			2回以内		
おうとう パパイヤ かんしょ さといも やまのいも やまのいも(むかご)		ハダニ類	1000倍		100～300 L/10a					収穫7日前 まで	
だいず		ハダニ類	1500倍		100～300 L/10a	収穫7日前 まで					
あずき			1000～ 2000倍		100～150 L/10a	収穫14日 前まで					
いんげんまめ 豆類(未成熟)			1500倍		—	収穫7日前 まで					
いちご(親株)			1000～ 1500倍			収穫前日まで 仮植前まで					
なす			ハダニ類 ハモグリバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ		1500倍	100～300 L/10a				—	2回以内
トマト ミニトマト			ハモグリバエ類 トマトサビダニ コナジラミ類								
ピーマン			ハダニ類 コナジラミ類	1000倍	収穫前日 まで			1回		1回	
ししとう 甘長とうがらし			チャノホコリダニ	1000～ 1500倍							
きゅうり			ハダニ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	1000～ 1500倍	100～300 L/10a			—	2回以内	2回以内	
			ハモグリバエ類	1000倍							
きゅうり(花) きゅうり(葉)		ハダニ類 コナジラミ類	1500倍	収穫3日前 まで							
食用へちま		ハダニ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで						
すいか					収穫7日前 まで						
メロン		ハモグリバエ コナジラミ	—	—	収穫前日 まで			2回以内	2回以内		
アスパラガス セルリー		収穫3日前 まで									
みつば		ガラス室 等の施設	2000倍	—	収穫3日前 まで	1回		1回			
	収穫前日 まで										
せり(水耕栽培)	—	ハダニ類	1500倍	300L/10a	—	1回	散布 、 但し花穂の発生期 にはマルチフィル ム被覆により散布 液が直接花穂に飛 散しない状態で 使用する				
せり科葉菜類 (みつば、コリア ンダー(葉)、セル リー、せり(水耕栽 培)、あしたばを除 く)								2000倍	100～300 L/10a	—	2回以内
あしたば			1500倍								
モロヘイヤ			2000倍	100～300 L/10a	—	2回以内		2回以内			
エンサイ			1500倍								
ふだんそう			—	—	—	—		2回以内	2回以内		
さといも(葉柄) はずいも(葉柄)										1000倍	100～400 L/10a
みょうが(花穂)			—	—	—	—		2回以内	2回以内		
みょうが(莖葉)										100～400 L/10a	みょうが(花 穂)の収穫前 日まで 但し、花穂を 収穫しない場 合にあっては 開花期終了ま で
しそ			ハダニ類 サビダニ類 チャノホコリダニ	2000倍	100～300 L/10a	—		2回以内	散布		
しそ科葉菜類 (えごま(葉)、しそ を除く) しそ(花穂) さんしょう(葉) コリアンダー(葉) なんてん(葉)	1000倍	100～400 L/10a	—				2回以内			2回以内	
えごま(葉) 食用金魚草 食用なでしこ しよくようほおずき 食用ミニバラ											1500倍
食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレンシア 食用パンジー	1000倍	—	—				2回以内			2回以内	
せんぶり	シクラメンホコリダニ										1000倍
きく(葉)	ハモグリバエ類 ハダニ類	1500倍	収穫前日 まで				2回以内			2回以内	
きく	—	—	—								
宿根かすみそう	ハダニ類	1000～ 1500倍	100～200 L/10a				—			—	—

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。