

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメクチン				
りんご	—	ハダニ類 キンモンホソガ リンゴサビダニ ユキヤナギアブラムシ	1000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	1回	散布	1回				
もも ネクタリン 小粒核果類 いちじく		ハダニ類 モモサビダニ			収穫7日前 まで							
なし		ハダニ類	1000～ 1500倍		収穫前日 まで							
おうとう パパイヤ かんしょ さといも やまのいも やまのいも(むかご)		ハダニ類	1000倍		100～300 L/10a				収穫前日 まで			
だいず				1500倍	100～300 L/10a	収穫7日前 まで						
あずき				1000～ 2000倍	100～150 L/10a	収穫14日 前まで						
いんげんまめ 豆類(未成熟)				1500倍		収穫7日前 まで						
いちご(親株床)				1000～ 1500倍		仮植前 まで						
なす				ハダニ類 ハモグリバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	1500倍			収穫前日 まで				
トマト ミニトマト				ハモグリバエ類 トマトサビダニ コナジラミ類								
ピーマン		ハダニ類 コナジラミ類	1000倍		収穫前日 まで							
		チャノホコリダニ	1000～ 1500倍									
ししとう 甘長とうがらし		コナジラミ類	2000倍		1回							
きゅうり		ハダニ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	1000～ 1500倍		収穫前日 まで							
きゅうり(花) きゅうり(葉)		ハダニ類 コナジラミ類	1500倍									
食用へちま		ハダニ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで							
すいか					収穫7日前 まで							
メロン					ハモグリバエ コナジラミ	収穫前日 まで						
アスパラガス セルリー						収穫3日前 まで						
みつば					収穫3日前 まで ただし、伏 せ込み栽培 は伏せ込み 前まで							
せり(水耕栽培)	ガラス室 等の施設	2000倍		収穫前日 まで								
せり科葉菜類 (みつば、コリア ンダー(葉)、セル リー、せり(水耕栽 培)、あしたばを除 く)	—	ハダニ類	2000倍	300L/10a	収穫3日前 まで	1回	散布、 但し花穂の発生期 にはマルチフィル ム被覆により散布 液が直接花穂に飛 散しない状態で 使用する	1回				
あしたば												
モロヘイヤ					1500倍			収穫前日 まで				
エンサイ					2000倍	100～300 L/10a						
ふだんそう					1500倍							
さといも(葉柄) はすいも(葉柄)												
みょうが(花穂)					1000倍	100～400 L/10a		みょうが(花 穂)の収穫前 日まで 但し、花穂を 収穫しない場 合にあつては 開花期終了ま で	2回以内	2回以内		
みょうが(茎葉)												
しそ					ハダニ類 サビダニ類 チャノホコリダニ					1回	散布	1回
しそ科葉菜類 (えごま(葉)、しそ を除く) しそ(花穂) さんしょう(葉) コリアンダー(葉) なんてん(葉)					ハダニ類	2000倍		100～300 L/10a	収穫前日 まで			
えごま(葉) 食用金魚草 食用なでしこ しよくようほおずき 食用ミニバラ	2回以内	2回以内										
食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレニア 食用パンジー	1回	1回										
せんぶり	シクラメンホコリダニ	1000倍	収穫7日前 まで									
きく(葉)	ハモグリバエ類 ハダニ類	1500倍	収穫前日 まで									
きく				2回以内			2回以内					
宿根かすみそう	ハダニ類	1000～ 1500倍	100～200 L/10a	—								

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。