

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	テトラピオン
林木	林地	ススキ	ススキの 発芽直前～ 発芽初期	10倍	50mL/ 株径30～50cm (但し、30L/10a まで)	1回	本剤を水で 10倍に希釈し 株の中央部に 散布する。 (株処理)	1回
開墾後に 栽培する 樹木類	開墾地							2回以内
すぎ (地ごしらえ、下刈り) ひのき (地ごしらえ、下刈り)	—							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	テトラピオン
				薬量	希釈水量			
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面、鉄道等	ヨシ	出芽前～ 生育期	3～5L /10a	50～200L /10a	2回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布又は全面 土壌散布	2回以内
		一年生イネ科雑草	雑草発生前 ～生育期	1.5～3L /10a				
		ハマスゲ	生育期					
		ススキ ササ	秋冬期～ 生育初期					

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。