

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	テトラピオン
開墾後に栽培する樹木類	開墾地	ススキ	秋冬期～出芽初期	ススキ1株(平均株径30cm基準)当り15g(但し、10kg/10aまで)		スポット処理散布	1回
		ササ		3～5kg/10a		全面均一散布	
すぎ (地ごしらえ、下刈り) ひのき (地ごしらえ、下刈り)	—	ススキ		ススキ1株(平均株径30cm基準)当り15g(但し、10kg/10aまで)	1回	スポット処理散布	2回以内
		ササ		3～5kg/10a		全面均一散布	
とどまつ (下刈り)	ササ	秋冬期 (但し土壌凍結前)	2～4kg/10a	1回			
からまつ (下刈り)	ススキ		3～4kg/10a				
ぶな (地ごしらえ、下刈り)	ササ		2～3kg/10a				
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、のり面、鉄道等	チガヤ	生育期		10～20kg/10a		植栽地を除く樹木等の周辺地に全面均一散布
		ススキ ササ	秋冬期～出芽初期	5～10kg/10a			
		一年生イネ科雑草	雑草発生前～生育期	2～10kg/10a	2回以内		

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。