作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	テトラピオンを含む農薬の総使用回数
開墾後に栽培する樹木類	開墾地	ススキ	秋冬期～出芽初期	ススキ１株（平均株径 30cm 基準）当り 15g（但し、10kg/10a まで）	１回	ｽﾎﾟｯﾄ処理散布	１回
				3～5kg/10a		全面均一散布	
		ササ		3～5kg/10a		全面均一散布	
すぎ（地ごしらえ、下刈り）	－	ススキ	秋冬期～出芽初期	ススキ１株（平均株径 30cm 基準）当り 15g（但し、10kg/10a まで）	１回	ｽﾎﾟｯﾄ処理散布	２回以内
				3～5kg/10a		全面均一散布	
		ササ		3～5kg/10a		全面均一散布	
ひのき（地ごしらえ、下刈り）	－	ススキ	秋冬期～出芽初期	ススキ１株（平均株径 30cm 基準）当り 15g（但し、10kg/10a まで）	１回	ｽﾎﾟｯﾄ処理散布	２回以内
				3～5kg/10a		全面均一散布	
		ササ		3～5kg/10a		全面均一散布	
とどまつ（下刈り）	－	ササ	秋冬期（但し土壌凍結前）	2～4kg/10a	１回	全面均一散布	１回
からまつ（下刈り）	－	ススキ ササ	秋冬期（但し土壌凍結前）	3～4kg/10a	１回	全面均一散布	１回
ぶな（地ごしらえ、下刈り）	－	ササ	秋冬期（但し土壌凍結前）	2～3kg/10a	１回	全面均一散布	１回
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	チガヤ	生育期	10～20kg/10a	１回	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面均一散布	２回以内
		ススキ ササ	秋冬期～出芽初期	5～10kg/10a			
		一年生イネ科雑草	雑草発生前～生育期	2～10kg/10a	２回以内		