

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラド	
西洋芝 (パーミューダグラス)	ダラースポット病 カーブラリア葉枯病	2000倍	0.5L/m ²	発病初期	8回以内	散 布	8回以内	
西洋芝 (ベントグラス)	雪腐小粒菌核病	400倍	0.1L/m ²	根雪前				
	ダラースポット病			発病初期				
	ダラースポット病 フェアリーリング病 炭疽病 葉腐病(ブラウンパッチ) テッドスポット病	2000倍	0.5L/m ²					秋～春期
	疑似葉腐病(イエローパッチ)							
西洋芝 (ライグラス) 西洋芝 (ブルーグラス)	雪腐小粒菌核病	400倍	0.1L/m ²	根雪前				
日本芝	疑似葉腐病(春はげ症)	2000倍	0.25L/m ²	休眠期前				
	葉腐病(ラージパッチ)			発病初期				
	カーブラリア葉枯病		0.25 ~ 0.5L/m ²					
	フェアリーリング病 さび病 ネクロティックリングスポット病		0.5L/m ²		秋～春期			
日本芝 (こうらいしば)	ダラースポット病	発病初期						

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。