作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ペンチオピラ ドを含む農薬 の総使用回数
西洋芝 (バーミューダグラス)	ダラースポット病 カーブラリア葉枯病	2000 倍	0.5L/m ²	発病初期	8 回以内	散布	8 回以内
西洋芝 (ベントグラス)	雪腐小粒菌核病	400 倍	0.1L/m ²	根雪前	8 回以内	散布	8 回以内
	ダラースポット病			発病初期			
	ダラースポット病 フェアリーリング病 炭疽病 葉腐病 (ブラウンパッチ) デッドスポット病 疑似葉腐病 (イエローパッチ)	2000 倍	0.5L/m ²	発病初期			
	雪腐小粒菌核病			秋～春期			
西洋芝 (ライグラス)	雪腐小粒菌核病	2000 倍	0.5L/m ²	根雪前	8 回以内	散布	8 回以内
		400 倍	0.1L/m ²				
西洋芝 (ブルーグラス)	雪腐小粒菌核病	2000 倍	0.5L/m ²	根雪前	8 回以内	散布	8 回以内
		400 倍	0.1L/m ²				
日本芝	疑似葉腐病 (春はげ症)	2000 倍	0.25L/m ²	休眠期前	8 回以内	散布	8 回以内
	葉腐病 (ラージパッチ)			発病初期			
	カーブラリア葉枯病		0.25～0.5 L/m ²	発病初期			
	フェアリーリング病 さび病 ネクロティックリングスポット病			0.5L/m ²			
日本芝 (こうらいしば)	ダラースポット病	2000 倍	0.5L/m ²	発病初期	8 回以内	散布	8 回以内