

登録番号 第 24953 号

グラミン[®]P

- 特長：
- 有効成分は、パーム油から抽出した天然物由来の成分です。
 - 生分解性に優れ、環境にやさしい展着剤です。
 - 湿展性に優れ、散布液の濡れ性が向上します。
 - 泡立ちが少なく、使いやすい展着剤です。

グラミンは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標です。

有効成分	ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル・・・30.0%	包装	500ml×20
性状	淡黄色澄明可乳化液体	有効年限	5 年
毒性	普通物 [※]	危険物	第二石油類（水溶性）

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用病害及び使用方法】

2025 年 2 月 26 日付内容

作物名	適用農薬名	使用量	使用方法
果樹類	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
野菜類	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
花き類	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
稲	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
麦類	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
豆類(種実)	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
いも類	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
雑穀類	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
てんさい	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
ホップ	殺菌剤、殺虫剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
茶	殺菌剤、殺虫剤	2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000 倍)	添加
芝	殺菌剤、殺虫剤	2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000 倍)	添加
りんご	摘果剤(NAC 剤)	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
ぶどう	シナミド液剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加
適用農薬の登録内容の作物	セトジミ乳剤、クレトジミ乳剤、シロホップブチル乳剤	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加

作物名	適用農薬名	適用病虫害名	使用量	使用方法
適用農薬の登録内容の作物	非選択性茎葉処理型除草剤	一年生雑草 多年生雑草	1～2mL/散布液 10 ^{1/2} ℓ (5000～10000 倍)	添加

使用上の注意事項-----

使用の際はビンを軽く振ってから使用すること。

人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法-----

(1) 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

ア 農薬使用者に係る注意事項

- 1) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 3) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

(2) 使用に際して講ずべき被害防止方法

該当なし

生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨-----

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨-----

危険物第4類第2石油類に属するので火気には十分注意すること。

貯蔵上の注意事項-----

火気をさけ、直射日光のあたらない低温な場所に密栓して保管すること。