

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサート
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつ、 パイン、 ブルーベリーを除く)	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
かんきつ		一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	2回以内		4回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
豆類 (種実、ただし だいず、 らつかせいを 除く)		一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回		3回以内
だいず					少量散布 25～50 L/10a			
えだまめ		一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回		3回以内
					少量散布 25～50 L/10a			
小麦		一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回		3回以内
					少量散布 25～50 L/10a			
小麦	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
麦類 (小麦を除く)	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
かんしょ	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
野菜類 (えだまめ、 キャベツ、 はつかだいこん、 とうがらし類、 にんじん、 ピーマン、 ねぎ、 たまねぎ、 アスパラガス、 オリーブ(葉)、 きゅうり、 トマト、 なす、 びわ(葉)、 ほうれんそう、 レタス、 薬用いんじん、 豆類(種実、 ただし、 らつかせいを 除く)、かんしょ を除く)	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
とうがらし類 にんじん ピーマン	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
アスパラガス オリーブ(葉) きゅうり しゃくやく(薬用) たらきのき トマト なす びわ(葉) ほうれんそう レタス	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
薬用いんじん	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
キャベツ	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
だいこん	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
はつか だいこん	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
ねぎ たまねぎ	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
さとうきび (春植え)	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
茶	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	1回	3回以内		
				少量散布 25～50 L/10a				
水田作物 (水稲を除く)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a	1回	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
移植水稲	水田畦畔	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a	1回	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
直播水稲	休耕地	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a	2回以内	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
水田作物 (水田刈跡)	休耕地	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a	2回以内	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
水田作物 (水田畦畔)	休耕地	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a	2回以内	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
水田作物、 畑作物 (休耕地)	休耕地	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a	4回以内	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
樹木類	圃場内の 周縁部	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	4回以内	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
樹木等	圃場内の 周縁部	一年生雑草	雑草生育期	500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 25L/10a、 5～15L/10a	3回以内	3回以内	
				1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
樹木等	圃場内の 周縁部	一年生雑草	雑草生育期	2000 mL/10a	通常散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a	3回以内	3回以内	
				500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
林木	圃場内の 周縁部	一年生雑草	雑草生育期	1000 mL/10a	通常散布 20～30 L/10a、 5～15L/10a	3回以内	3回以内	
				500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a			
牧草	圃場内の 周縁部	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50L/10a 少量散布 5～15L/10a	2回以内	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
牧草	圃場内の 周縁部	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50L/10a 少量散布 5～15L/10a	2回以内	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			
林木 畑作物	圃場内の 周縁部	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 25～50 L/10a	2回以内	3回以内	
				500～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサート
林木	林地	クズ	春期又は秋期	原液又は 2倍液	1～2mL/株	-	株頭注入処理	-
					1mL/ヶ所 樹径 ヶ所数 10cm以下 2～3 10～20cm 4～8 20cm以上 10		立木注入処理	
樹木等	公園、庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	落葉雑かん木	5～10月	原液又は 2倍液	切り口全体に 十分量を塗布	-	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 切株塗布処理	-
					雑かん木		伐採直後	
林木 畑作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏～秋期	原液	5～15mL/本	-	竹稈注入処理	-

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。