

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量(薬量)	使用量(希釈水量)	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
果樹類 (かんきつ、パイナップルを除く)	－	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
かんきつ	－	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	5回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
野菜類 (えだまめ、キャベツ、はつかだいこん、だいこん、とうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、たらきのき、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、薬用になじん、豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、かんしょを除く)	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
だいず	－	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	4回以内
			は種後出芽前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
			畦間処理:雑草生育期但し、収穫前日まで		通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
かんしょ	－	一年生雑草	耕起又は挿苗7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
えだまめ	－	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
とうがらし類	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
にんじん	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
ピーマン	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
アスパラガス	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
オリーブ(葉)	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
きゅうり	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
しゃくやく(薬用)	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
たらきのき	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
トマト	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
なす	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
びわ(葉)	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
ほうれんそう	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
レタス	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
薬用になじん	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	10回以内 (1年間に2回以内)
キャベツ	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
だいこん	－	一年生雑草	耕起又はは種7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
たまねぎ	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
			定植後畦間処理但し、 収穫30日前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
はつかだいこん	－	一年生雑草	耕起又はは種7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
ねぎ	－	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
			定植後畦間処理但し、 収穫30日前まで (雑草生育期)		通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
麦類 (小麦を除く)	－	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)		通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
小麦	－	多年生(裸粒)雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	250～1000 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
			は種後出芽前 (雑草生育期)	500～1000 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
	多年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	500～1000 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回			
さとうきび (春植え)	－	一年生雑草	耕起10日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	6回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
水田作物 (水稻を除く)	－	一年生雑草	耕起20～10日前 (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
移植水稻	－	一年生雑草	耕起20～10日前 (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
			湛水30～5日前 (雑草生育期) (不耕起栽培)		50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
		多年生雑草	湛水30～5日前 (雑草生育期) (不耕起栽培)	500～1000 mL/10a	50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
直播水稻	－	一年生雑草	耕起20～10日前 (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
			耕起直後～出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	250～1000 mL/10a	少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
		多年生雑草	は種30日前～出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)		500mL/10a	50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a		
			耕起直後～出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)					
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
水田作物、畑作物 (休耕地)	休耕地	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
茶	－	一年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内
牧草	牧野、草地(更新・造成)	一年生雑草	更新・造成の10日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
		一年生及び多年生雑草	は種10日前～は種当日 (耕起整地後：雑草発生前期)	250～500 mL/10a	少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
樹木類	－	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500mL/10a	通常散布 100 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a 少量散布 25 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		1000 mL/10a				
		雑草	生育盛期	2000 mL/10a	少量散布 25～50 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a			
林木	造林地(地ごしらえ)	スギ、ササ類、クヌ等	生育盛期以降	1000 mL/10a	少量散布 20～30 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a、 5～15 $\frac{\text{g}}{\text{a}}$ /10a	3回以内	雑草木茎葉散布	3回以内
		落葉雑草						
●注入処理								
作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クヌ	春期又は秋期	原液又は2倍液	1～2mL/株	－	株頭注入処理	－
		落葉雑草	5～10月		1mL/ヶ所 樹径 ヶ所数 10cm以下 2～3 10～20cm 4～8、 20cm以上			