

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサート	
				薬量	希釈水量				
果樹類 (かんきつ、 パイン類を除く)		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a	3回以内		3回以内	
		多年生雑草		500～1000 mL/10a					
かんきつ		一年生雑草		250～500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a			5回以内	
		多年生雑草		500～1000 mL/10a					
豆類 (種実、ただし だいず、 らっかせいを除く)		一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a	2回以内		2回以内	
だいず									は種後出芽前まで (雑草生育期)
	えだまめ	畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫前日まで	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	1回		3回以内			
小麦		多年生イネ科 雑草					耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	250～1000 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a
	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100 L/10a 少量散布 5～15L/10a					
麦類 (小麦を除く)	圃場内の 周縁部	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内		3回以内	
									耕起7日前まで (雑草生育期)
かんしょ		一年生雑草	耕起又は挿苗 7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a	1回		2回以内	
									耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)
野菜類 (えだまめ、 キャベツ、 はつかだいこん、 だいこん、とうが らし類、にんじん、 ピーマン、ねぎ、 たまねぎ、 アスパラガス、 オリーブ(葉)、 きゅうり、たらきの、 トマト、なす、 びわ(葉)、 ほうれんそう、 レタス、 薬用になじん、 豆類(種実、 ただし、 らっかせいを 除く)、かんしょ を除く)		一年生雑草	耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a	1回		1回	
とうがらし類 にんじん ピーマン									通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a
アスパラガス オリーブ(葉) きゅうり しゃくやく(薬用) たらきの トマト なす びわ(葉) ほうれんそう レタス		一年生雑草	耕起又はは種 7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a	1回		3回以内	
薬用になじん									通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a
キャベツ		一年生雑草	耕起又はは種 7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a	1回		1回	
だいこん									通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a
はつか だいこん	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内							
ねぎ たまねぎ			通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a	3回以内					
さとうきび (春植え)	耕起10日前まで (雑草生育期)	500～1000 mL/10a			通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a	6回以内			
茶	摘採7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a	1回					
水田作物 (水稲を除く)	耕起20～10日前 (雑草生育期)		通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a						
移植水稲	多年生雑草	湛水 30～5日前 (雑草生育期) (不耕起栽培)	500～1000 mL/10a	50L/10a	2回以内				
直播水稲	一年生雑草	耕起20～10日前 (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5～15L/10a		2回以内			
	多年生雑草	耕起直後～ 出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	250～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a					
	一年生雑草	は種30日前～ 出芽前 (雑草生育期)	250～1000 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a					
	多年生雑草	(乾田不耕起栽培)	500mL/10a	50L/10a					
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a	1回		1回	
多年生雑草	500～1000 mL/10a								
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 25L/10a			3回以内	
多年生雑草	500～1000 mL/10a								
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a、 5～15L/10a	2回以内		3回以内	
樹木類	一年生雑草	雑草生育期							通常散布 50～100 L/10a 少量散布 25～50 L/10a
樹木等	公園、庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	多年生雑草	500 mL/10a	1000 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 25L/10a、 5～15L/10a	3回以内		植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布	
		スギナ	生育盛期						2000 mL/10a
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類、 クズ等の 多年生雑草 落葉雑かん木	生育盛期以降	1000 mL/10a	少量散布 20～30 L/10a、 5～15L/10a			雑草木茎葉散布	3回以内
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生雑草	更新・造成の 10日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50L/10a 少量散布 5～15L/10a	2回以内		雑草茎葉散布	
		多年生雑草		500～1000 mL/10a					
		一年生及び 多年生雑草	は種10日前～ は種当日 (耕起整地後： 雑草発生前期)	250～500 mL/10a	少量散布 25～50 L/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサート
林木	林地	クズ	春期又は秋期	原液又は 2倍液	1～2mL/株	-	株頭注入処理	-
樹木等	公園、庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	落葉雑かん木	5～10月		1mL/ヶ所 樹径 ヶ所数 10cm以下 2～3 10～20cm 4～8 20cm以上 10		立木注入処理	
		雑かん木	伐採直後	切り口全体に 十分量を塗布	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 切株塗布処理			
林木 畑作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏～秋期	原液	5～15mL/本		竹稈注入処理	

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです