

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量(薬量)	使用量(希釈水量)	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
果樹類 (かんきつ、パイナップルを除く)	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a	3回 以内	雑草茎 葉散布	3回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	25~50% 10a			
かんきつ	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a	3回 以内	雑草茎 葉散布	5回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	25~50% 10a			
野菜類 (えだまめ、キャベツ、はつかだいこん、だいこん、とうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、たらのき、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、薬用にんじん、豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	1回
かんしょ	-	一年生雑草	耕起又は 挿苗7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
豆類 (種実、ただし、 だいず、らっかせいを除く)	-	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	2回 以内	雑草茎 葉散布	2回以内
えだまめ	-	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
だいず	-	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	2回 以内	雑草茎 葉散布	4回以内
			は種後出芽前まで (雑草生育期)					
			畦間処理: 雑草生育期 但し、 収穫前日まで					
とうがらし類	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
にんじん	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
ピーマン	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
アスパラガス	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
オリーブ (葉)	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
きゅうり	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
しゃくやく (薬用)	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
たらのき	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
トマト	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
なす	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
びわ(葉)	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
ほうれんそう	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
レタス	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
薬用にんじん	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	10回以内 (1年間に 2回以内)
キャベツ	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	1回
だいこん	-	一年生雑草	耕起又は は種7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
はつかだいこん	-	一年生雑草	耕起又は は種7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	1回
たまねぎ	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	3回 以内	雑草茎 葉散布	3回以内
			定植後畦間処理 但し、 収穫30日前まで (雑草生育期)					
さとうきび (春植え)	-	一年生雑草	耕起10日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	6回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	25~50% 10a、 5~15% 10a			
麦類 (小麦を除く)	-	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	3回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)		通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a			
小麦	-	多年生 イネ科雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	250~1000 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	3回 以内	雑草茎 葉散布	3回以内
		一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a			
			は種後出芽前 (雑草生育期)					
	多年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	500~1000 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回			
ねぎ	-	一年生雑草	耕起又は 定植7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	3回 以内	雑草茎 葉散布	3回以内
			定植後畦間処理 但し、 収穫30日前まで (雑草生育期)		通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a			
水田作物 (水稲を除く)	-	一年生雑草	耕起20~10日前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
移植水稲	-	一年生雑草	耕起20~10日前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
		多年生雑草	湛水30~5日前 (雑草生育期) (不耕起栽培)	500~1000 mL/10a	50% 10a			
直播水稲	-	一年生雑草	耕起20~10日前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
			耕起直後~出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	250~1000 mL/10a	少量散布 25~50% 10a			
		多年生雑草	は種30日前 ~出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)	500mL/10a	50% 10a			
			起直後~出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)					
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	1回	雑草茎 葉散布	1回
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	25~50% 10a、 5~15% 10a			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100% 少量散布 25% 10a	2回 以内	雑草茎 葉散布	3回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	25% 10a			
水田作物、 畑作物 (休耕地)	休耕地	一年生雑草	雑草生育期	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a	2回 以内	雑草茎 葉散布	3回以内
茶	-	一年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	少量散布 25~50% 10a	1回	雑草茎 葉散布	2回以内
牧草	牧野、 草地 (更新・ 造成)	一年生雑草	更新・造成の 10日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50% 少量散布 5~15% 10a	2回 以内	雑草茎 葉散布	3回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	5~15% 10a			
		一年生 及び 多年生 雑草	は種10日前 ~は種当日 (耕起整地後: 雑草発生前期)	250~500 mL/10a	少量散布 25~50% 10a			
樹木類	-	一年生雑草	雑草生育期	250~500 mL/10a	通常散布 50~100% 少量散布 25~50% 10a	4回 以内	雑草茎 葉散布	4回以内
樹木等	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500mL/10a	通常散布 100% 少量散布 25% 10a、 5~15% 10a	3回 以内	植栽地を 除く 樹木等 の周辺 地に 雑草 茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草	雑草生育期	1000 mL/10a	少量散布 25% 10a、 5~15% 10a			
		刈り 生	生育盛期	2000 mL/10a	少量散布 25~50% 10a、 5~15% 10a			
林木	造林地 (地ご らえ)	スズ、 ササ、 クサ等 の 多年生 雑草  落葉 雑草	生育盛期以降	1000 mL/10a	少量散布 20~30% 10a、 5~15% 10a	3回 以内	雑草木 茎葉散 布	3回以内

  

●注入処理									
作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈 倍数	使用液量	本剤の 使用回数	使用方法	グリホサート を含む農薬の 総使用回数	
林木	林地	クサ	春期又は 秋期	原液又は 2倍液	1~2mL/株	-	株頭 注入処理	-	
		落葉雑草 かん 木	5~10月		1mL/箇所 樹径 箇所数 10cm以下 2~3 10~20cm 4~8、 20cm以上 10		立木 注入処理		
	林地、 放置竹 林、 畑地	竹類	夏~秋期	原液	5~15mL/本		竹稈 注入処理		
畑作物	林地、 放置竹 林、 畑地	竹類	夏~秋期	原液	5~15mL/本	-	竹稈 注入処理	-	
樹木等	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	落葉雑草 かん 木	5~10月	原液又は 2倍液	1mL/箇所 樹径 箇所数 10cm以下 2~3、 10~20cm 4~8、 20cm以上 10	-	立木 注入処理	-	
		雑草かん 木	伐採直後		切り口全体に十分 量を塗布		植栽地を 除く 樹木等 の周辺 地に 切 株塗布 処理		