

殺菌剤

第18210号

ネビジン® 粉剤

種類名：フルスルファミド粉剤

特長

- 幅広いアブラナ科作物の根こぶ病に安定した効果を示します。
- 残効性に優れ長期間効果が持続します。
- 毎年の連用により、効果がより一層安定します。

【有効成分】 フルスルファミド 0.3%

【性状】 淡黄色粉末 45 μm以下 【毒性】 普通物* 【危険物】 -

【有効年限・包装】 5年・1kg×20

*普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

ネビジンは三井化学アグロ(株)の登録商標です。



商品規格

規 格		入 数
1kg		20
希望小売価格・税抜 (税込価格)		
1,500円 (1,650円)		
サイズ幅×高さ×奥行 (mm)		重 量
個 装 145×230× 80		1.0kg
外 箱 440×220×320		22.0kg
ITFコード		
24571151611624		
JANコード		
4571151611620		

適用病害虫・使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルスルファミド		
キャベツ	菌核病	30kg/10a (30g/m ²)	定植前	2回以内	全面土壤混和	2回以内		
	根こぶ病	20~30kg/10a (20~30g/m ²)						
		20kg/10a (20g/m ²)	作条土壤混和					
		20~30kg/10a (20~30g/m ²)			は種又は定植前			
		20kg/10a (20g/m ²)	全面土壤混和					
		30kg/10a (30g/m ²)			1回			
		20kg/10a (20g/m ²)	作条土壤混和					
		30kg/10a (30g/m ²)						
なばな	なばな類 (なばな、みずかけなを除く)	は種前	1回	全面土壤混和	1回			
みずかけな		は種又は定植前						
かぶ		は種前						
だいこん	そうか病	30kg/10a (30g/m ²)	植付時	作条土壤混和	2回以内 (種いも 浸漬は 1回以内、 土壤混和は 1回以内)			
ばれいしょ	そうか病 粉状そうか病	60kg/10a (60g/m ²)						

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

使用上の注意

- 本剤の所定量を作条又は全面に散布し、土壤とよく混和した後、は種、定植又は植付けすること。
- 本剤の作条土壤混和を行う際は、本剤の所定量を畦上全面に散布し、土壤中に均一に分布するようよく混和すること。
- つまみ菜・間引き菜には使用しないこと。
- ばれいしょのそうか病に対しては、多発性条件では効果が劣る場合があるので注意すること。
- みずかけなに使用する場合、水掛け開始は薬剤処理後2ヵ月以降を厳守すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- 誤食などのないように注意すること。
- 本剤による中毒(痙攣)の治療法としては動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されている。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法では、その該当がない。

貯蔵上の注意事項

直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。