作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルスルファミドを含む農薬の総使用回数
キャベツ	菌核病	30kg/10a (30g/m^2)	定植前	2回以内	全面土壌混和	2回以内
	根こぶ病	20～30kg/10a (20～30g/m^2)	は種又は定植前			
		20kg/10a (20g/m^2)			作条土壌混和	
はくさい	根こぶ病	20～30kg/10a (20～30g/m^2)	は種又は定植前	1回	全面土壌混和	1回
		20kg/10a (20g/m^2)			作条土壌混和	
ブロッコリー	根こぶ病	20～30kg/10a (20～30g/m^2)	は種又は定植前	1回	全面土壌混和	1回
		20kg/10a (20g/m^2)			作条土壌混和	
カリフラワー	根こぶ病	20～30kg/10a (20～30g/m^2)	は種又は定植前	1回	全面土壌混和	1回
		20kg/10a (20g/m^2)			作条土壌混和	
非結球あぶらな科葉菜類（なばな類を除く）	根こぶ病	20～30kg/10a (20～30g/m^2)	は種又は定植前	1回	全面土壌混和	1回
		20kg/10a (20g/m^2)			作条土壌混和	
レタス 非結球レタス	菌核病	20～30kg/10a (20～30g/m^2)	定植前	1回	全面土壌混和	1回
なばな類	根こぶ病	20～30kg/10a (20～30g/m^2)	は種又は定植前	1回	全面土壌混和	1回
			は種前		作条土壌混和	
		20kg/10a (20g/m^2)	定植前		作条土壌混和	
かぶ	根こぶ病	30kg/10a (30g/m^2)	は種又は定植前	1回	全面土壌混和	1回
		20kg/10a (20g/m^2)			作条土壌混和	
だいこん	根こぶ病	30kg/10a (30g/m^2)	は種前	1回	全面土壌混和	1回
ばれいしょ	そうか病	30kg/10a (30g/m^2)	植付時	1回	作条土壌混和	2回以内 (種いも浸漬は 1回以内、 土壌混和は1回以内)
	そうか病 粉状そうか病	60kg/10a (60g/m^2)			全面土壌混和	