

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソキサチオン		
はくさい	コオロギ類 ネキリムシ類	3kg/10a (3g/m ²)	は種時又は 定植時～生育初期 但し、収穫14日前 まで	1回	土壌表面 株元処理	1回		
キャベツ だいこん はつかだいこん	ネキリムシ類		は種時又は定植時					
ブロッコリー			定植時～生育初期 但し、収穫14日前 まで	4回以内		4回以内		
レタス			は種時又は 定植時～生育初期 但し、収穫21日前 まで	2回以内		2回以内		
非結球レタス			は種時又は定植時					
なばな			発芽期まで	1回		1回		
だいず			は種時～本葉2葉期			2回以内		
えだまめ				収穫21日前まで		2回以内	5回以内 (粉剤及び粉粒剤の は種時の処理は 合計1回以内、 粉剤及び粉粒剤の 定植時は 合計1回以内、 粉剤の土壌表面 散布は 1回以内、 粒剤の土壌表面 株元処理は 2回以内)	
いちご			ハスモンヨトウ	収穫前日まで		1回	1回	
葉ごぼう			ネキリムシ類	は種時～子葉展開期		2回以内	2回以内	
さといも ごぼう				収穫14日前まで		4回以内	4回以内	
かぶ							2回以内	
ねぎ				収穫30日前まで		2回以内	4回以内 (は種時は1回以内、 植付時は1回以内、 植付後は2回以内)	
にんじん				発芽期～生育初期 但し、収穫14日前 まで		4回以内	4回以内	
メロン			コオロギ類	収穫直前まで		1回	配置	1回
えごま(種子)			ネキリムシ類	定植時			土壌表面株元処理	
たばこ	植付時	株元処理		2回以内				

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。