

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフラン			
きゅうり	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、 定植後の株元散布は 1回以内、散布は2回 以内)			
	アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布				
メロン		ハモグリバエ類 アザミウマ類			2g/株	定植時	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回以内、 散布は2回以内)	
アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	2g/株	すいか		ワタアブラムシ				生育期 但し、収穫 21日前まで
	かぼちゃ								
なす	ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1～2g/株	生育期 但し、収穫 前日まで		2回以内	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回以内、 散布及び定植後の 株元散布は合計2回 以内)		
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株							
トマト ミニトマト	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1～2g/株	定植時		1回	植穴土壌混和	5回以内 (培土混和及び灌注は 合計1回以内、育苗期 の株元散布は1回以内、 定植時の土壌混和は 1回以内、散布及び 定植後の株元散布は 合計2回以内)		
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	生育期 但し、収穫 前日まで		2回以内	株元散布			
ピーマン	アザミウマ類	1～2g/株	定植時		1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回以内、 散布及び定植後の 株元散布は合計2回 以内)		
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫 前日まで	2回以内	株元散布				
とうがらし類	アザミウマ類	1～2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回以内、 定植後の株元散布は 1回以内、散布は2回 以内)			
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布				
キャベツ		2g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和 及び灌注は合計1回 以内、散布及び無人航空機 散布は合計2回以内)			
	アオムシ コナガ	2～3g/株							
ハイマダラノメイガ	3g/株								
アブラムシ類	2g/株								
はくさい	アオムシ コナガ	2～3g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は合計1回 以内、散布は2回以内)			
	ハイマダラノメイガ	3g/株							
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2g/株				3回以内(定植時の 土壌混和及び灌注は 合計1回以内、散布及び 無人航空機散布は合計 2 回以内)			
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6g/m ²	生育期 但し、収穫 3日前まで		2回以内	株元散布	4回以内 (は種時の 土壌混和、育苗トレイ への灌注及び定植時の 株元散布は合計1回以内、 生育期の株元灌注は、1 回以内、散布、無人航空 機散布及び定植後の 株元散布は合計2回以内)		
にんじん	ハモグリバエ類	9g/m ²	は種時	1回	播溝土壌混和	4回以内 (は種時の 土壌混和は1回以内、 生育期の株元灌注は1回 以内、散布は2回以内)			
だいこん	アブラムシ類 キスジノミハムシ	6g/m ²	生育期 但し、収穫 30日前まで		全面土壌混和	5回以内 (は種時の 播溝土壌混和は1回以内、 は種時の全面土壌混和は 1回以内、粒剤の散布は 1回以内、水溶性の散布、 液剤の散布及び無人 航空機散布は合計2回 以内)			
		4～6g/m ²			散布				
		9g/m ²			土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の 土壌混和は合計1回 以内、散布は2回以内)			
チンゲンサイ	アブラムシ類 キスジノミハムシ	6g/m ²	定植時		播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和 は1回以内、散布は 2回以内)			
非結球あぶらな科 葉菜類 (チンゲンサイを 除く)			は種時		播溝土壌混和	3回以内 (は種時の 土壌混和は1回以内、 散布、空中散布、 無人航空機散布は合計 2 回以内)			
かぶ									
だいず	フタスジヒメハムシ					3回以内 (は種時の 土壌混和は1回以内、 散布、空中散布、 無人航空機散布は合計 2 回以内)			
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9g/m ²	定植時		播溝土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布は2回以内)			
					植溝土壌混和				
いちご	ワタアブラムシ	0.5～1g/株			植穴土壌混和	1回			
オクラ	アブラムシ類	9g/m ²	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布	3回以内 (株元散布は1回以内、 散布は2回以内)			
さやえんどう	ハモグリバエ類								
きく ガーベラ	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)	定植時	5回以内	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)			
	マメハモグリバエ	2g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)	生育期						
	アブラムシ類	20g/m ²							
花き類・ 観葉植物 (きく、 ガーベラ を除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)	定植時	1回	植穴土壌混和				
	アブラムシ類	20g/m ²	生育期	5回以内	株元散布				
つつじ類	ツツジゲンバイ		発生初期			5回以内			
えだまめ	フタスジヒメハムシ	6g/m ²	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時の 土壌混和は1回以内、 散布、空中散布、無人航 空機散布は合計2回以 内)			
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2g/株	定植時		植穴土壌混和	4回以内 (は種前の 培土混和は1回以内、 育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は 合計1回以内、 散布は2回以内)			
しそ	マデイラコナカイガラムシ	2g/株 (但し、1m ² 当り 25gまで)				3回以内 (定植時の 土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)			

■については有効成分を含む農業の総使用回数を示すものです。