

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
きゅうり	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時		植穴土壌混和	
		1g/株	生育期 但し、収穫開始14日前まで		株元散布	
メロン	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株				
	コナジラミ類	1~2g/株				
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
			生育期 但し、収穫21日前まで		株元散布	
かぼちや	アブラムシ類 コナジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
なす	ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和	
			コナジラミ類	生育期 但し、収穫前日まで	株元散布	
ピーマン	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	定植時	植穴土壌混和		
			生育期 但し、収穫前日まで	株元散布		
トマト	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和	
			コナジラミ類	生育期 但し、収穫前日まで	株元散布	
ミニトマト	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和	
			コナジラミ類	生育期 但し、収穫前日まで	株元散布	
とうがらし類	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和	
			生育期 但し、収穫開始14日前まで		株元散布	
キャベツ	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	アオムシ コナガ	2~3g/株				
	ハイマダラノメイガ	3g/株				
はくさい	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
	アオムシ コナガ	2~3g/株				
	ハイマダラノメイガ	3g/株				
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
しそ	マデイラコナカイガラムシ (但し、1㎡当たり25gまで)	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
えだまめ	フタスジヒメハムシ	6g/㎡	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6g/㎡	定植時	1回	株元散布	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
			生育期 但し、収穫3日前まで	2回以内		
にんじん	ハモグリバエ類	9g/㎡	は種時	1回	播溝土壌混和	4回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)
だいこん	アブラムシ類	6g/㎡	は種時	1回	播溝土壌混和	5回以内 (は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	キスジノミハムシ	4~6g/㎡	は種時		播溝土壌混和	
		9g/㎡	は種時		全面土壌混和	
6g/㎡	生育期 但し、収穫30日前まで	散布				
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6g/㎡	定植時	1回	土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
	アブラムシ類 キスジノミハムシ		は種時	1回	播溝土壌混和	
非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)	アブラムシ類 キスジノミハムシ	6g/㎡	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
かぶ	アブラムシ類 キスジノミハムシ	6g/㎡	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
ほうれんそう	アブラムシ類	6g/㎡	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
だいず	フタスジヒメハムシ	6g/㎡	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9g/㎡	は種時	1回	播溝土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
			定植時		植溝土壌混和	
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	1回
オクラ	アブラムシ類	9g/㎡	生育期 但し、収穫開始14日前まで	1回	株元散布	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)
さやえんどう	ハモグリバエ類	9g/㎡	生育期 但し、収穫開始14日前まで	1回	株元散布	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)
きく	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1㎡当たり30gまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	マメハモグリバエ	2g/株 (但し、1㎡当たり30gまで)				
	アブラムシ類	20g/㎡	生育期	5回以内	株元散布	
ガーベラ	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1㎡当たり30gまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	マメハモグリバエ	2g/株 (但し、1㎡当たり30gまで)	生育期	5回以内	株元散布	
	アブラムシ類	20g/㎡				
花き類・観葉植物(さく、ガーベラを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1㎡当たり30gまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	アブラムシ類	20g/㎡	生育期	5回以内	株元散布	
つつじ類	ツツジグンバイ	6g/㎡	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内