

家庭園芸用殺虫殺菌剤

庭木のケムシや うどんこ病に

庭木用



園芸用殺虫殺菌スプレー

サンヨール®・トレボン®スプレー

種類名: エトフェンプロックス・DBEDC水和剤

- ケムシやアブラムシの害虫防除をしながら、同時に病気予防ができる殺虫殺菌スプレーです。
- 殺虫成分のトレボン(成分名:エトフェンプロックス)は造園業者にも使われるケムシ用殺虫剤です。

1000ml × 16

容量 × 入数

サンヨール®・トレボン®スプレー

【有効成分】 エトフェンプロックス…………… 0.020%
DBEDC…………… 0.040%

【性状】 淡青紫色水性和懸濁液体
【毒性】 普通物*

【有効年限・包装】 3年・1000mL×16

※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物、の指定を受けない物質を示す。

適用病害虫と使用方法

2021年4月30日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを含む 農薬の総使用回数	DBEDCを含む 農薬の総使用回数
樹木類	うどんこ病、ケムシ類、 アブラムシ類	原液	発生初期	6回以内	散布	6回以内	8回以内
ばら	うどんこ病、黒星病、 アブラムシ類、ハダニ類、 チュウレンジハバチ						
きく	うどんこ病、白さび病、 アブラムシ類、ハダニ類						
花き類・観葉植物 (ばら・きくを除く)	うどんこ病、アブラムシ類、 ハダニ類、ナメクジ類						
きゅうり	うどんこ病、べと病、 アブラムシ類、コナジラミ類		収穫前日 まで	3回以内	3回以内	4回以内	
トマト	灰色かび病、葉かび病、 アブラムシ類、コナジラミ類	2回以内	2回以内	2回以内			

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

使用上の注意

- 使用に際しては容器をよく振ること。
- ハウス又は露地栽培で高温時の場合には葉の変色等の薬害を生ずるおそれがあるので、その場合は使用をさけること。
- 多湿下の施設内で使用する場合は、散布した薬液が速く乾燥するように通気性をよくして散布すること。
- ミツバチ及び蚕に対して影響があるので、注意して使用すること。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- 人に向かって噴射しないこと。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

- 引火性があるので、火気に十分注意すること。

貯蔵上の注意事項

- 火気を避け、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管すること。
- 子供の手の届かない場所に保管すること。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。● 防除日誌を記載しましょう。

※本印刷物は2021年4月30日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

販売元



三井化学
グループ

株式会社 エムシー緑化

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-1
TEL 03-5290-2956 FAX 03-5290-2957
ホームページ <https://www.mc-ryokka.com>

取扱い