

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDC	
きゅうり	うどんこ病、べと病 コナジラミ類、アブラムシ類 ハダニ類	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
トマト ミニトマト	うどんこ病、葉かび病 灰色かび病 コナジラミ類、アブラムシ類 ハダニ類						
ピーマン	うどんこ病 アブラムシ類						
すいか メロン	うどんこ病 アブラムシ類、ハダニ類						
かぼちゃ	うどんこ病						
いちご	ハダニ類 うどんこ病 アブラムシ類		6回以内	6回以内 (定植前の苗浸漬は 1回以内)			
ばら	アブラムシ類、チュウレンジハバチ 黒星病、ハダニ類 うどんこ病、ナメクジ類		—	開花前まで		8回以内	
きく	白さび病、アブラムシ類 ハダニ類、うどんこ病 ナメクジ類		—				
ペチュニア スターチス プリムラ パンジー	うどんこ病 ナメクジ類 ハダニ類 アブラムシ類		—				
さるすべり	うどんこ病 アブラムシ類、カイガラムシ類 ケムシ類、イラガ類		—	8回以内			8回以内
まさき さざんか	ツノロウムシ、ケムシ類 イラガ類	—	—				
つつじ類	ツツジゲンバイ ツツジコナジラミ ケムシ類 イラガ類	—	—				
樹木類 (つつじ類、 まさき、 さるすべり、 さざんかを 除く)	ケムシ類 イラガ類	—	—				
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法		DBEDC
花き類 観葉植物 (きく、ばら ペチュニア、 スターチス、 プリムラ、 パンジーを 除く)	うどんこ病 ハダニ類 アブラムシ類 ナメクジ類	原液	—	8回以内	散布		8回以内
日本芝	葉腐病(ラージパッチ) さび病						

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。