

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	DBEDC を含む 農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 べと病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
トマト	うどんこ病 葉かび病 灰色かび病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
ミニトマト	うどんこ病 葉かび病 灰色かび病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
ピーマン	うどんこ病 アブラムシ類	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
すいか	うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
メロン	うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
かぼちゃ	うどんこ病	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
いちご	ハダニ類 うどんこ病 アブラムシ類	原液	収穫前日まで	6回以内	散布	6回以内 (定植前の苗浸漬は 1回以内)
ばら	アブラムシ類 チュウレンジハバチ 黒星病 ハダニ類 うどんこ病 ナメクジ類	原液	-	8回以内	散布	8回以内
きく	白さび病 アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病 ナメクジ類	原液	-	8回以内	散布	8回以内
ペチュニア	うどんこ病 ナメクジ類 ハダニ類 アブラムシ類	原液	開花前まで	8回以内	散布	8回以内
スターチス	うどんこ病 ナメクジ類 ハダニ類 アブラムシ類	原液	開花前まで	8回以内	散布	8回以内
プリムラ	うどんこ病 ナメクジ類 ハダニ類 アブラムシ類	原液	開花前まで	8回以内	散布	8回以内
パンジー	うどんこ病 ナメクジ類 ハダニ類 アブラムシ類	原液	開花前まで	8回以内	散布	8回以内
さるすべり	うどんこ病 アブラムシ類 カイガラムシ類 ケムシ類 イラガ類	原液	-	8回以内	散布	8回以内
まさき	ツノロウムシ ケムシ類 イラガ類	原液	-	8回以内	散布	8回以内
さざんか	ツノロウムシ ケムシ類 イラガ類	原液	-	8回以内	散布	8回以内
つつじ類	ツツジグンバイ ツツジコナジラミ ケムシ類 イラガ類	原液	-	8回以内	散布	8回以内
樹木類 (つつじ類、まさき、さるすべり、 さざんかを除く)	ケムシ類 イラガ類	原液	-	8回以内	散布	8回以内
花き類・観葉植物 (きく、ばら、ペチュニア、 スターチス、プリムラ、パンジー を除く)	うどんこ病 ハダニ類 アブラムシ類 ナメクジ類	原液	-	8回以内	散布	8回以内
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ) さび病	原液	-	8回以内	散布	8回以内