

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDC				
さやえんどう 実えんどう	うどんこ病 灰色かび病	500倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m <sup>2</sup> )	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内				
なす	うどんこ病 すすかび病	700倍									
トマト ミニトマト	葉かび病、灰色かび病	500倍									
	うどんこ病	500～ 700倍									
ピーマン 甘長とうがらし	うどんこ病 アブラムシ類	500倍									
きゅうり	べと病、うどんこ病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類										
	すいか メロン うり類(漬物用) にがうり							うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類			
かぼちゃ ズッキーニ											
いちご	うどんこ病							—	定植前	1回	瞬間～5分間 苗浸漬 5分間苗浸漬
		800倍 500～ 1000倍									
		灰色かび病 アブラムシ類、ハダニ類		収穫前日 まで	6回以内						
花き類 観葉植物 (きく、ばら、 ペチュニア、 スターチス、 プリムラ、 パンジーを除く)	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m <sup>2</sup> )	発生初期	8回以内	散布	8回以内				
きく	うどんこ病、褐斑病、灰色かび病 白さび病、黒斑病 アブラムシ類、ハダニ類										
ばら	うどんこ病	500～ 1000倍									
	灰色かび病、黒星病 アブラムシ類、ハダニ類 チュレンジハバチ	500倍									
ペチュニア	うどんこ病、灰色かび病 アブラムシ類、ハダニ類 ナメクジ類	250～ 500倍						開花前 まで			
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDC				
スターチス プリムラ パンジー	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m <sup>2</sup> )	開花前 まで	8回以内	散布	8回以内				
樹木類 (つつじ類を除く)	うどんこ病 アブラムシ類		200～700 L/10a (200～700 mL/m <sup>2</sup> )	発生初期							
つつじ類	ツツジゲンバイ ツツジコナジラミ うどんこ病 アブラムシ類										
たばこ	うどんこ病		25～180 L/10a (25～180 mL/m <sup>2</sup> )	—	2回以内		2回以内				
日本芝	葉腐病(ラージパッチ) さび病	300～ 500倍	0.5L/m <sup>2</sup>	発生初期	8回以内		8回以内				

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです