

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンブロックス		
稲		コブノメイガ	1000倍	60～150 L/10a (60～150 mL/m ²)	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内		
		ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオイムシ イナゴ類	1000～2000倍							
		カメムシ類 イネミズゾウムシ	2000倍							
		ウンカ類	300～600倍							
		ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	300倍	25L/10a (25mL/m ²)						
		カメムシ類	600倍							
麦類		ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000倍	60～150 L/10a (60～150 mL/m ²)		2回以内		2回以内		
きび		アカスジカスミカメ				3回以内		3回以内		
あわ		アワヨトウ アワノメイガ		100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)		3回以内		3回以内		
とうもろこし 飼料用とうもろこし (子実)		アワノメイガ アワヨトウ ツマジロクサヨトウ	1000倍		収穫7日前まで	4回以内		4回以内		
かんきつ	—	コアオハナムグリ ケシキスイ類		200～700 L/10a (200～700 mL/m ²)	収穫前日まで					
		ミカンハモグリガ	1000～2000倍							
マンゴー		チャノキイロアザミウマ	1000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内		
ブロッコリー		アオムシ			収穫前日まで					
キャベツ		アオムシ コナガ ヨトウムシ	1000～2000倍		収穫3日前まで 収穫7日前まで					
はくさい		アオムシ			収穫7日前まで					
だいこん		アブラムシ類			収穫21日前まで					
ねぎ		シロイチモジヨトウ				2回以内		2回以内		
レタス		アブラムシ類			収穫14日前まで					
すいか		アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫3日前まで	3回以内		3回以内		
					収穫前日まで					
					収穫3日前まで	4回以内		4回以内		
にがうり		アブラムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類 カメムシ類 ウリノメイガ			収穫前日まで	3回以内		3回以内		
作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンブロックス		
かぼちゃ	—	コナジラミ類 ウリハムシ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
なす		アブラムシ類	1000～2000倍							
トマト		コナジラミ類								
ピーマン		アブラムシ類								
オクラ		アブラムシ類 カメムシ類								
さやえんどう 実えんどう		シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ								
さやいんげん		ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ	1000倍							
えだまめ		マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ							2回以内	
		ハスモンヨトウ	1000～2000倍						収穫14日前まで	
未成熟ささげ		アブラムシ類							収穫前日まで	
ばれいしょ		ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ							3回以内	収穫7日前まで
かんしょ		ハスモンヨトウ							3回以内	収穫14日前まで 収穫7日前まで
さといも										
さといも(葉柄)										
やまのいも やまのいも (むかご)		アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ								
豆類 (種実、ただし、 だいず、あずきを 除く)		マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ							2回以内	
		アズキノメイガ								
だいず		マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ	1000倍						2回以内	収穫14日前まで
あずき		マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類								
		ホウキギツツミノガ							3回以内	収穫30日前まで
ほうきぎ	ホウキギツツミノガ									
しょうが 葉しょうが	ハスモンヨトウ			3回以内	収穫7日前まで					
てんさい	ヨトウムシ	1000～2000倍			3回以内	収穫14日前まで				
作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンブロックス		
せんきゅう	—	ウリハムシモドキ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内		
モロヘイヤ		アザミウマ類				1回		1回		
あしたば		アブラムシ類	2000倍							
ふき		コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ						3回以内		
うど			1000倍					根株養成期 但し、 収穫45日前まで		
みつば		アブラムシ類						2回以内	収穫21日前まで 但し、伏せ込み栽培 は伏せ込み前まで	
食用ぎく			2000倍					3回以内	収穫3日前まで	
せり		水田								
せり(水耕栽培)		ガラス室等の施設				1000倍		100～150 L/10a (100～150 mL/m ²)	収穫30日前まで	
みずいも		水田	オキナワイナゴモドキ						3回以内	収穫14日前まで
茶	—	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000倍	200～400 L/10a (200～400 mL/m ²)	摘採21日前まで	2回以内		2回以内		
たばこ		タバコガ ヨトウムシ		25～180 L/10a (25～180 mL/m ²)	収穫10日前まで					
とうき 採種用とうき		キアゲハ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)						
樹木類 (つつじ類、 ポインセチア、 ソテツを除く)	—	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000倍		幼虫発生期					
		オビカレハ	2000倍							
つつじ類		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000倍							
		オビカレハ	2000倍	100～700 L/10a (100～700 mL/m ²)	—					
ポインセチア		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000倍		幼虫発生期	6回以内		6回以内		
		オビカレハ	2000倍							
ソテツ		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000倍							
		オビカレハ	2000倍		幼虫発生期					
宿根かすみそう		クロマダラソテツシジミ	2000～4000倍							
		シロイチモジヨトウ	1000倍							
りんどう		ヨトウムシ			—					
きく カーネーション		ヒラズハナアザミウマ	2000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	発生初期					
ゆり		アブラムシ類								
トルコギキョウ		ハスモンヨトウ	1000倍							
水田作物、 畑作物(休耕地)	ヨシ、オギ、 ススキ、セイタ カアワダチソウ 等の多年生雑草 が優占している 休耕地	カメムシ類	2000倍	60～150 L/10a (60～150 mL/m ²)	—	3回以内		3回以内		

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。