

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンブロックス				
稲	-	コブノメイガ	1000倍	60～150 L/10a (60～150 mL/m ²)	収穫14日前まで	3回以内	-	3回以内				
		ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオウムシ イナゴ類	1000～2000倍									
		カメムシ類 イネミスズウムシ	2000倍									
		ウンカ類	300～600倍	25L/10a (25mL/m ²)								
		ツマグロヨコバイ イネミスズウムシ イネドロオウムシ	300倍									
		カメムシ類	600倍									
麦類	-	ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000倍	60～150 L/10a (60～150 mL/m ²)	2回以内	-	2回以内					
きび	-	アカスジカスミカメ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	3回以内	-	3回以内					
あわ	アワヨトウ アワノメイガ	アワノメイガ アワヨトウ ツマジロクサヨトウ			4回以内	-	4回以内					
とうもろこし 飼料用とうもろこし (子実)	コアオハナムグリ ケシキスイ類				200～700 L/10a (200～700 mL/m ²)	収穫前日まで	散布	3回以内				
かんきつ	ミカンハモグリガ	1000～2000倍	収穫7日前まで									
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍	1000倍	3回以内								
ブロッコリー	-	アオムシ	1000～2000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫前日まで	3回以内	3回以内					
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ	アブラムシ類			収穫3日前まで							
はくさい	アブラムシ類				収穫7日前まで							
だいこん	-	シロイチモジヨトウ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫21日前まで	2回以内	2回以内					
ねぎ	アブラムシ類	アブラムシ類 コナジラムシ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ			収穫14日前まで	3回以内	3回以内					
レタス	アブラムシ類				収穫3日前まで							
すいか	-	アブラムシ類 コナジラムシ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫前日まで	4回以内	4回以内					
きゅうり	アブラムシ類	収穫3日前まで										
メロン	アブラムシ類	収穫前日まで			3回以内			3回以内				
にがうり	-	アブラムシ類 コナジラムシ類 ヨトウムシ類 カメムシ類 ウリノメイガ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫前日まで	3回以内	3回以内					
作物名	適用場所	適用病害虫名			希釈倍数			使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンブロックス
かぼちゃ	-	コナジラムシ類 ウリハムシ			1000倍			100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫前日まで	3回以内	-	3回以内
なす	-	アブラムシ類	1000～2000倍									
トマト	-	コナジラムシ類	-	2回以内	2回以内							
ピーマン	-	アブラムシ類										
オクラ	-	アブラムシ類 カメムシ類	1000倍	2回以内	2回以内							
さやえんどう 実えんどう	-	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ										
さやいんげん	-	ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ										
えだまめ	-	マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ	1000～2000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	2回以内	3回以内	-	3回以内				
	未成熟ささげ ばれいしょ	アブラムシ類							収穫前日まで			
かんしょ	-	ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ	-	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	3回以内	-	3回以内					
さといも	-	ハスモンヨトウ						収穫7日前まで				
さといも(葉柄)	-	アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ						収穫14日前まで 収穫7日前まで				
やまのいも やまのいも (むかご)	-	アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	2回以内	-	-					
豆類 (種実、ただし、 だいず、あずきを 除く)	-	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ						2回以内	2回以内			
	だいず	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ツメクサガ										
あずき	-	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類	-	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	3回以内	-	3回以内					
ほうきぎ	-	ホウキギツツミノガ						収穫30日前まで				
しょうが 葉しょうが	-	ハスモンヨトウ						収穫7日前まで				
てんさい	-	ヨトウムシ	1000～2000倍	1000～2000倍	3回以内	3回以内						
作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンブロックス				
せんきゅう	-	ウリハムシモドキ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	収穫14日前まで	3回以内	-	3回以内				
モロヘイヤ		アザミウマ類							1回	1回		
あしたば		アブラムシ類							2000倍			
ふき		コナジラムシ類 フキノメイガ ヨトウムシ	1000倍						2回以内			
うど		アブラムシ類								根株養成期 但し、 収穫45日前まで		
みつば										収穫21日前まで 但し、伏せ込み栽培 は伏せ込み前まで		
食用ぎく	-	アブラムシ類	2000倍	2000倍	3回以内	3回以内						
せり	水田	オキナワイナゴモドキ	1000倍	100～150 L/10a (100～150 mL/m ²)	-	-	-	-				
せり(水耕栽培)	ガラス室等の施設								1000倍	1000倍	3回以内	3回以内
みずいも	水田	オキナワイナゴモドキ	1000倍	100～150 L/10a (100～150 mL/m ²)	3回以内	3回以内	3回以内					
茶	-	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000倍	200～400 L/10a (200～400 mL/m ²)	2回以内	-	-	2回以内				
たばこ	-	タバコガ ヨトウムシ							25～180 L/10a (25～180 mL/m ²)	収穫10日前まで		
とうき 採種用とうき	-	キアゲハ	1000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	-	-	-	-				
樹木類 (つつじ類、 ポインセチア、 ソテツを除く)	-	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000倍	100～700 L/10a (100～700 mL/m ²)					幼虫発生期			
		オビカレハ	2000倍						幼虫発生期			
つつじ類	-	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000倍	100～700 L/10a (100～700 mL/m ²)	幼虫発生期							
		オビカレハ	2000倍		6回以内							
ポインセチア	-	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000倍	100～700 L/10a (100～700 mL/m ²)	幼虫発生期							
		オビカレハ	2000倍		6回以内							
ソテツ	-	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000倍	100～700 L/10a (100～700 mL/m ²)	幼虫発生期							
		オビカレハ	2000倍		6回以内							
宿根かすみそう	-	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ	1000倍	1000倍	発生初期	発生初期						
りんどう	-	ヒラズハナアザミウマ	2000倍	100～300 L/10a (100～300 mL/m ²)	-	-	-					
きく カーネーション	アブラムシ類	2000倍										
ゆり	-	ハスモンヨトウ	1000倍	1000倍	発生初期	発生初期						
トルコギキョウ	-	ハスモンヨトウ	1000倍	1000倍	発生初期	発生初期						
水田作物、 畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、 ススキ、セイタ カアワダチソウ 等の多年生雑草 が優占している 休耕田	カメムシ類	2000倍	60～150 L/10a (60～150 mL/m ²)	3回以内	3回以内	3回以内					

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです