

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンブロックス
稲		イネツトムシ	4kg/10a (4g/m ²)	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
		カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロヨコバイ ウンカ類、コブノメイガ アザミウマ類、イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ	3～4kg/10a (3～4g/m ²)				
		イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ	3kg/10a (3g/m ²)				
		ヒメトビウンカ アブラムシ類	4kg/10a (4g/m ²)				
大豆類(種実)	ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類、アズキノメイガ	収穫14日前まで		2回以内	2回以内		
えだまめ	ハスモンヨトウ					3～4kg/10a (3～4g/m ²)	
	マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ					4kg/10a (4g/m ²)	
やまのいも	シロイチモジヨトウ		収穫7日前まで				3回以内
さといも	ハスモンヨトウ						
ばれいしょ	テントウムシダマシ類						
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ						
とうもろこし 飼料用とうもろこし (子実)	アワノメイガ	4kg/10a (4g/m ²)	収穫7日前まで	4回以内		4回以内	
トマト	コナジラミ類						
オクラ	アブラムシ類						
きゅうり	ウリハムシ						3～4kg/10a (3～4g/m ²)
なす	テントウムシダマシ類	4kg/10a (4g/m ²)	収穫3日前まで	3回以内		3回以内	
すいか	ハスモンヨトウ ウリハムシ						
かぼちゃ	コナジラミ類						
キャベツ	ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ						3～4kg/10a (3～4g/m ²)
はくさい		アオムシ	4kg/10a (4g/m ²)	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
		コナガ					
だいこん		アオムシ	3～4kg/10a (3～4g/m ²)	収穫21日前まで	3回以内		3回以内
		ダイコンハムシ					
れんこん		マメコガネ	4kg/10a (4g/m ²)	収穫14日前まで			
水田作物、 畑作物 (休耕地)	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチソウ 等の多年生雑草が 優占している休耕地	カメムシ類	3～4kg/10a (3～4g/m ²)	—	—	—	—

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。