

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックス					
稲		イネツトムシ	4kg/10a (4g/m <sup>2</sup> )	収穫7日前まで	3回以内		3回以内					
		カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロヨコバイ ウンカ類、コブノメイガ アザミウマ類、イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ	3～4kg/10a (3～4g/m <sup>2</sup> )									
		イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ	3kg/10a (3g/m <sup>2</sup> )									
小麦		ヒメトビウンカ アブラムシ類	4kg/10a (4g/m <sup>2</sup> )	収穫14日前まで	2回以内	2回以内						
豆類(種実)	ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類、アズキノメイガ	3～4kg/10a (3～4g/m <sup>2</sup> )										
	えだまめ						ハスモンヨトウ					
やまのいも	—	シロイチモジヨトウ	4kg/10a (4g/m <sup>2</sup> )	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					
さといも		ハスモンヨトウ										
ばれいしょ		テントウムシダマシ類										
かんしょ		ハスモンヨトウ ナカジロシタバ										
とうもろこし 飼料用とうもろこし (子実)		アワノメイガ										
トマト		コナジラミ類										
オクラ		アブラムシ類										
きゅうり		ウリハムシ						3～4kg/10a (3～4g/m <sup>2</sup> )	収穫前日まで	2回以内		2回以内
なす		テントウムシダマシ類										
すいか		ハスモンヨトウ ウリハムシ						4kg/10a (4g/m <sup>2</sup> )	収穫3日前まで			
かぼちゃ	コナジラミ類	3～4kg/10a (3～4g/m <sup>2</sup> )	収穫前日まで	3回以内		3回以内						
キャベツ	ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ		収穫3日前まで									
	アオムシ		収穫7日前まで									
はくさい	コナガ	4kg/10a (4g/m <sup>2</sup> )	収穫7日前まで	3回以内		3回以内						
だいこん	アオムシ	3～4kg/10a (3～4g/m <sup>2</sup> )	収穫21日前まで									
	ダイコンハムシ	4kg/10a (4g/m <sup>2</sup> )										
れんこん	マメコガネ	4kg/10a (4g/m <sup>2</sup> )	収穫14日前まで	—								
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチソウ 等の多年生雑草が 優占している休耕田	カメムシ類	3～4kg/10a (3～4g/m <sup>2</sup> )									

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。