

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数				
稲	－	コブノメイガ	1000 倍	60～150L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
		ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオイムシ イナゴ類	1000～2000 倍									
		カメムシ類 イネミズゾウムシ	2000 倍									
		ウンカ類	300～600 倍	25L/10a								
		ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	300 倍									
		カメムシ類	600 倍									
麦類	－	ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000 倍	60～150L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
きび	－	アカスジカスミカメ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
あわ	－	アワトウトウ アワノメイガ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
とうもろこし	－	アワノメイガ アワトウトウ ツマジロクサヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内				
飼料用とうもろこし(子実)	－	アワノメイガ アワトウトウ ツマジロクサヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内				
かんきつ	－	コオアハナムグリ ケシキスイ類	1000 倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
		ミカンハモグリガ	1000～2000 倍									
		チャノキイロアザミウマ	2000 倍									
マンゴー	－	チャノキイロアザミウマ	1000 倍	200～700L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
ブロッコリー	－	アオムシ	1000～2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
キャベツ	－	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1000～2000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
はくさい	－	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1000～2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
だいこん	－	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1000～2000 倍	100～300L/10a	収穫 21 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
ねぎ	－	シロイチモジヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 21 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
レタス	－	アブラムシ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
すいか	－	アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
きゅうり	－	アブラムシ類 コナジラミ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
メロン	－	アブラムシ類 コナジラミ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内				
にがうり	－	アブラムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類 カメムシ類 ウリノメイガ	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
かぼちゃ	－	コナジラミ類 ウリハムシ	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
なす	－	アブラムシ類	1000～2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
		コナジラミ類	1000 倍									
トマト	－	コナジラミ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内				
ピーマン	－	アブラムシ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
オクラ	－	アブラムシ類 カメムシ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内				
さやえんどう	－	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内				
実えんどう	－	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内				
さやいんげん	－	ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内				
えだまめ	－	マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
		ハスモンヨトウ	1000～2000 倍									
未成熟さげ	－	アブラムシ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内				
ばれいしょ	－	アブラムシ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
かんしょ	－	ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
さといも	－	ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
さといも(葉柄)	－	ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
やまのいも	－	アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
やまのいも(むかご)	－	アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く)	－	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
だいず	－	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
あずき	－	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
ほうきぎ	－	ホウキギツツミノガ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
しょうが	－	ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
薬しょうが	－	ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
てんさい	－	ヨトウムシ	1000～2000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
せんきゅう	－	ウリハムシモドキ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
モロヘイヤ	－	アザミウマ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	1 回	散布	1 回				
あしたば	－	アブラムシ類	2000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
ふき	－	コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
うど	－	アブラムシ類	1000 倍	100～300L/10a	根株養成期 但し、収穫 45 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
みつば	－	アブラムシ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫 21 日前まで 但し、伏せ込み 栽培は伏せ込み前 まで	2 回以内	散布	2 回以内				
食用ぎく	－	アブラムシ類	2000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
じゅんさい	じゅんさい田	マダラズメイガ ジュンサイハムシ	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内				
せり	水田	アブラムシ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫 30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
せり(水耕栽培)	ガラス 室等の施設	アブラムシ類	1000 倍	100～300L/10a	収穫 30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
みずいも	水田	オキナワイナゴモドキ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
茶	－	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000 倍	200～400L/10a	摘採 21 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
たばこ	－	タバコガ ヨトウムシ	2000 倍	25～180L/10a	収穫 10 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
		アブラムシ類 タバコノミハムシ	1000～2000 倍									
おうぎ	－	ウリハムシモドキ	1000 倍	100～300L/10a	収穫 45 日前まで	4 回以内 (1 年間に 2 回以内)	散布	4 回以内 (1 年間に 2 回以内)				
とうき	－	キアゲハ	1000 倍	100～300L/10a	幼虫発生期	6 回以内	散布	6 回以内				
採種用とうき	－	キアゲハ	1000 倍	100～300L/10a	幼虫発生期	12 回以内 (1 年間に 6 回以内)	散布	12 回以内 (1 年間に 6 回以内)				
樹木類(つじ類、ポインセチア、ソテツを除く)	－	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	100～700/10a	幼虫発生期	6 回以内	散布	6 回以内				
		オビカレハ	2000 倍									
つじ類	－	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	100～700/10a	幼虫発生期	6 回以内	散布	6 回以内				
		オビカレハ	2000 倍		－							
		ツツジグンバイ	2000 倍		－							
ポインセチア	－	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	100～700/10a	幼虫発生期	6 回以内	散布	6 回以内				
		オビカレハ	2000 倍		－							
		コナジラミ類	1000 倍		－							
ソテツ	－	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	100～700/10a	幼虫発生期	6 回以内	散布	6 回以内				
		オビカレハ	2000 倍									
		クロマダラソテツシジミ	2000～4000 倍									
宿根かすみそう	－	シロイチモジヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	－	6 回以内	散布	6 回以内				
		ヨトウムシ	2000 倍									
りんどう	－	ヒラズバナアザミウマ	2000 倍	100～300L/10a	－	6 回以内	散布	6 回以内				
きく	－	アブラムシ類	2000 倍	100～300L/10a	発生初期	6 回以内	散布	6 回以内				
カーネーション	－	アブラムシ類	2000 倍	100～300L/10a	発生初期	6 回以内	散布	6 回以内				
ゆり	－	アブラムシ類	2000 倍	100～300L/10a	－	6 回以内	散布	6 回以内				
トルコギキョウ	－	ハスモンヨトウ	1000 倍	100～300L/10a	－	6 回以内	散布	6 回以内				
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	2000 倍	60～150L/10a	－	3 回以内	散布	3 回以内				