

太字斜体下線部分が拡大しました。

| 作物名 | 適用病害 虫 / 雜 | 希釗倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使 用回数 | ジノテフラン |
|------------------|---------------|---|----------|--|-------------|--------------------------------------|
| 樹木類(つばき 類を除く) | ケムシ類 | 胸高直径6cm～10cm : 8～12ミリリットル、10cm ～20cm : 12～24ミリリットル、20cm～30cm : 24 ～36ミリリットル、30cm～40cm : 36～48ミリリッ トル、40cm～50cm : 48～60ミリリットル、50cm ～60cm : 60～72ミリリットル、以降、直径が10cm 増す毎に12ミリリットルを追加する | 樹幹注入 | 幼虫発生前 ～発生初期 (但し、新 葉展開後) | 3回以内 | 5回以内 |
| さくら | イロガ類 | 胸高直径6cm～10cm : 8～12ミリリットル、10cm ～20cm : 12～24ミリリットル、20cm～30cm : 24 ～36ミリリットル、30cm～40cm : 36～48ミリリッ トル、40cm～50cm : 48～60ミリリットル、50cm ～60cm : 60～72ミリリットル、以降、直径が10cm 増す毎に12ミリリットルを追加する | 樹幹注入 | 幼虫発生前 ～発生初期 (但し、新 葉展開後) | 3回以内 | 5回以内 |
| さくら | ヒザカツ ヤギリ | <u>注入部直径6cm～10cm : 8～12ミリリットル、</u> <u>10cm～20cm : 12～24ミリリットル、20cm～</u> <u>30cm : 24～36ミリリットル、30cm～40cm : 36～</u> <u>48ミリリットル、40cm～50cm : 48～60ミリ</u> <u>リットル、50cm～60cm : 60～72ミリリットル、</u> <u>以降、直径が10cm増す毎に12ミリリットルを追加</u> <u>する</u> | 樹幹注 入 | <u>新葉展開後</u> <u>～落葉前ま</u> <u>で</u> | 3回以内 | 5回以内 |
| ぶな | ブナハチ | 胸高直径6cm～10cm : 2ミリリットル、10cm～ 20cm : 2～12ミリリットル、20cm～30cm : 12～ 18ミリリットル、30cm～40cm : 18～24ミリリッ トル、40cm～50cm : 24～30ミリリットル、50cm～ 60cm : 30～36ミリリットル、以降、直径が10cm増 す毎に6ミリリットルを追加する | 樹幹注入 | 新葉展開直 前 | 3回以内 | 5回以内 |
| アラタス | アラタスグ ンバイ | 胸高直径6cm～10cm : 2ミリリットル、10cm～ 20cm : 2～12ミリリットル、20cm～30cm : 12～ 18ミリリットル、30cm～40cm : 18～24ミリリッ トル、40cm～50cm : 24～30ミリリットル、50cm～ 60cm : 30～36ミリリットル、以降、直径が10cm増 す毎に6ミリリットルを追加する | 樹幹注入 | 新葉展開後 | 3回以内 | 5回以内 |
| アメリカウ | イロガ類 | 胸高直径6cm～10cm : 8～12ミリリットル、10cm ～20cm : 12～24ミリリットル、20cm～30cm : 24 ～36ミリリットル、30cm～40cm : 36～48ミリリッ トル、40cm～50cm : 48～60ミリリットル、50cm ～60cm : 60～72ミリリットル、以降、直径が10cm 増す毎に12ミリリットルを追加する | 樹幹注入 | 幼虫発生前 ～発生初期 (但し、新 葉展開後) | 3回以内 | 5回以内 |
| つばき類 | ヤドカガ | 注入部直径6cm～10cm : 2ミリリットル、10cm～ 20cm : 2～12ミリリットル、20cm～30cm : 12～ 18ミリリットル、30cm～40cm : 18～24ミリリッ トル、40cm～50cm : 24～30ミリリットル、50cm～ 60cm : 30～36ミリリットル、以降、直径が10cm増 す毎に6ミリリットルを追加する | 樹幹注入 | 幼虫発生前 ～発生初期 | 3回以内 | 5回以内 (但し、 株元灌注 (は2回以 内)) |