

商品名 ウッドスター
 登録番号 23624
 種類名 ジノテフラン液剤
 含有量 8.0%

2017年11月22日に太字斜体部分が登録拡大しました。

作物名称	適用病害虫名称	希釈倍数・使用量	使用時期	本剤の使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
さくら	ケムシ類	胸高直径6cm～10cm: 8～12ミリリットル、10cm～20cm: 12～24ミリリットル、20cm～30cm: 24～36ミリリットル、30cm～40cm: 36～48ミリリットル、40cm～50cm: 48～60ミリリットル、50cm～60cm: 60～72ミリリットル、以降、直径が10cm増す毎に12ミリリットルを追加する	幼虫発生前～発生初期(但し、新葉展開後)	3回以内	5回以内
プラタナス	プラタナスグンバイ	胸高直径6cm～10cm: 2ミリリットル、10cm～20cm: 2～12ミリリットル、20cm～30cm: 12～18ミリリットル、30cm～40cm: 18～24ミリリットル、40cm～50cm: 24～30ミリリットル、50cm～60cm: 30～36ミリリットル、以降、直径が10cm増す毎に6ミリリットルを追加する	新葉展開後	3回以内	5回以内
アメリカフウ	アメリカシロヒトリ	胸高直径6cm～10cm: 8～12ミリリットル、10cm～20cm: 12～24ミリリットル、20cm～30cm: 24～36ミリリットル、30cm～40cm: 36～48ミリリットル、40cm～50cm: 48～60ミリリットル、50cm～60cm: 60～72ミリリットル、以降、直径が10cm増す毎に12ミリリットルを追加する	幼虫発生前～発生初期(但し、新葉展開後)	3回以内	5回以内
つばき類	チャドクガ	注入部直径6cm～10cm: 2ミリリットル、10cm～20cm: 2～12ミリリットル、20cm～30cm: 12～18ミリリットル、30cm～40cm: 18～24ミリリットル、40cm～50cm: 24～30ミリリットル、50cm～60cm: 30～36ミリリットル、以降、直径が10cm増す毎に6ミリリットルを追加する	幼虫発生前～発生初期	3回以内	5回以内(但し、株元灌注は2回以内)