

【変更内容】

- ・作物名「さくら（ケムシ類）」、「アメリカフウ（アメリカシロヒトリ）」を「樹木類（つばき類を除く）（ケムシ類）」に変更する。
- ・作物名「さくら（イラガ類）」を追加する。
- ・作物名「アメリカフウ（イラガ類）」を追加する。
- ・作物名「ぶな（ブナハバチ）」を追加する。

【変更後】 下線部分が追加登録されました。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメフェンを含む農薬の総使用回数
<u>樹木類</u> <u>(つばき類を除く)</u>	<u>ケムシ類</u>	胸高直径 6cm～10cm : 8～12ml 10cm～20cm : 12～24ml 20cm～30cm : 24～36ml	幼虫発生前 ～発生初期 但し新葉展開後	3回以内	樹幹 注入	5回以内
<u>さくら</u>	<u>イラガ類</u>	30cm～40cm : 36～48ml 40cm～50cm : 48～60ml 50cm～60cm : 60～72ml 以降、直径が 10cm 増す 毎に 12ml を追加する				
<u>アメリカフウ</u>						
つばき類	チャドクガ	注入部直径 6cm～10cm : 2ml 10cm～20cm : 2～12ml 20cm～30cm : 12～18ml 30cm～40cm : 18～24ml 40cm～50cm : 24～30ml 50cm～60cm : 30～36ml 以降、直径が 10cm 増す 毎に 6ml を追加する	幼虫発生前～ 発生初期			5回以内 (株元灌注 は2回以 内)
プラタナス	プラタナスグンバイ	胸高直径 6cm～10cm : 2ml 10cm～20cm : 2～12ml 20cm～30cm : 12～18ml 30cm～40cm : 18～24ml	新葉展開後			5回以内
<u>ぶな</u>	<u>ブナハバチ</u>	40cm～50cm : 24～30ml 50cm～60cm : 30～36ml 以降、直径が 10cm 増す 毎に 6ml を追加する	新葉展開直前			