

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフラン	
樹木類 (つばき類を除く)	ケムシ類	胸高直径 6cm ~ 10cm: 8 ~ 12mL 10cm ~ 20cm: 12 ~ 24mL 20cm ~ 30cm: 24 ~ 36mL	幼虫発生前 ~発生初期 但し 新葉展開後	3回以内	樹幹注入	5回以内	
アメリカフウ	イラガ類	30cm ~ 40cm: 36 ~ 48mL 40cm ~ 50cm: 48 ~ 60mL 50cm ~ 60cm: 60 ~ 72mL 以降、直径が10cm増す毎に 12mLを追加する					
さくら		クビアカツヤカミキリ	注入部直径 6cm ~ 10cm: 8 ~ 12mL 10cm ~ 20cm: 12 ~ 24mL 20cm ~ 30cm: 24 ~ 36mL 30cm ~ 40cm: 36 ~ 48mL 40cm ~ 50cm: 48 ~ 60mL 50cm ~ 60cm: 60 ~ 72mL 以降、直径が10cm増す毎に 12mLを追加する				新葉展開後~ 落葉前まで
つばき類	チャドクガ	注入部直径 6cm ~ 10cm: 2mL 10cm ~ 20cm: 2 ~ 12mL 20cm ~ 30cm: 12 ~ 18mL 30cm ~ 40cm: 18 ~ 24mL 40cm ~ 50cm: 24 ~ 30mL 50cm ~ 60cm: 30 ~ 36mL 以降、直径が10cm増す毎に 6mLを追加する	幼虫発生前 ~発生初期				5回以内 (株元灌注は 2回以内)
プラタナス	プラタナスグンバイ	胸高直径 6cm ~ 10cm: 2mL 10cm ~ 20cm: 2 ~ 12mL 20cm ~ 30cm: 12 ~ 18mL 30cm ~ 40cm: 18 ~ 24mL 40cm ~ 50cm: 24 ~ 30mL 50cm ~ 60cm: 30 ~ 36mL	新葉展開後				5回以内
ぶな	ブナハバチ	以降、直径が10cm増す毎に 6mLを追加する	新葉展開直前				

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。