作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを含む 農薬の総使用回数
樹木類 （つばき類 を除く）	ケムシ類	胸高直径 6cm～10cm ： 8～12ml、 10cm～20cm ： 12～24ml、 20cm～30cm ： 24～36ml、 30cm～40cm ： 36～48ml、 40cm～50cm ： 48～60ml、 50cm～60cm ： 60～72ml、 以降、直径が 10cm 増す毎に 12ml を 追加する	幼虫発生前 ～発生初期 但し新葉展開後	3 回以内	樹幹 注入	5 回以内
アメリカフ ウ	イラガ類	胸高直径 6cm～10cm ： 8～12ml、 10cm～20cm ： 12～24ml、 20cm～30cm ： 24～36ml、 30cm～40cm ： 36～48ml、 40cm～50cm ： 48～60ml、 50cm～60cm ： 60～72ml、 以降、直径が 10cm 増す毎に 12ml を 追加する	幼虫発生前 ～発生初期 但し新葉展開後	3 回以内	樹幹 注入	5 回以内
さくら	イラガ類	胸高直径 6cm～10cm ： 8～12ml、 10cm～20cm ： 12～24ml、 20cm～30cm ： 24～36ml、 30cm～40cm ： 36～48ml、 40cm～50cm ： 48～60ml、 50cm～60cm ： 60～72ml、 以降、直径が 10cm 増す毎に 12ml を 追加する	幼虫発生前 ～発生初期 但し新葉展開後	3 回以内	樹幹 注入	5 回以内
	クビアカツ ヤカミキリ	注入部直径 6cm～10cm ： 8～12ml、 10cm～20cm ： 12～24ml、 20cm～30cm ： 24～36ml、 30cm～40cm ： 36～48ml、 40cm～50cm ： 48～60ml、 50cm～60cm ： 60～72ml、 以降、直径が 10cm 増す毎に 12ml を 追加する	新葉展開後 ～落葉前まで	3 回以内	樹幹 注入	5 回以内
つばき類	チャドクガ	注入部直径 6cm～10cm ： 2ml、 10cm～20cm ： 2～12ml、 20cm～30cm ： 12～18ml、 30cm～40cm ： 18～24ml、 40cm～50cm ： 24～30ml、 50cm～60cm ： 30～36ml、 以降、直径が 10cm 増す毎に 6ml を 追加する	幼虫発生前 ～発生初期	3 回以内	樹幹 注入	5 回以内 （株元灌注は 2 回以 内）
プラタナス	プラタナス グンバイ	注入部直径 6cm～10cm ： 2ml、 10cm～20cm ： 2～12ml、 20cm～30cm ： 12～18ml、 30cm～40cm ： 18～24ml、 40cm～50cm ： 24～30ml、 50cm～60cm ： 30～36ml、 以降、直径が 10cm 増す毎に 6ml を 追加する	新葉展開後	3 回以内	樹幹 注入	5 回以内
ぶな	ブナハバチ	注入部直径 6cm～10cm ： 2ml、 10cm～20cm ： 2～12ml、 20cm～30cm ： 12～18ml、 30cm～40cm ： 18～24ml、 40cm～50cm ： 24～30ml、 50cm～60cm ： 30～36ml、 以降、直径が 10cm 増す毎に 6ml を 追加する	新葉展開直前	3 回以内	樹幹 注入	5 回以内